

# Bilan régional 2023



## Comptage des oiseaux des jardins Loire-Atlantique




## L'ESSENTIEL À RETENIR EN 2023

En 2023, vous avez été 926 à participer au comptage hivernal des oiseaux des jardins en Loire-Atlantique. Près de la moitié d'entre vous est fidèle à ce rendez-vous annuel et a déjà participé, au moins une fois, au comptage.

Comme les années précédentes, pas de changement à signaler dans le trio de tête concernant l'abondance moyenne. C'est toujours le Moineau domestique qui est vu en plus grand nombre avec en moyenne plus de 4 individus dans les jardins. Il est suivi de la Mésange charbonnière et de l'Étourneau sansonnet.


Les résultats sont également similaires pour la fréquence de présence dans les jardins. Le Rougegorge est présent dans 87 % des jardins ligériens. Nouveauté cette année à la troisième place du classement, le Moineau domestique est rejoint par la Mésange bleue qui sont présents tout deux dans 72 % des jardins en Loire-Atlantique.

### Fréquence



Espèces observées dans le plus grand nombre de jardins en 2023

### Abondance



Espèces présentant la plus grande abondance moyenne par jardin en 2023




## LA PARTICIPATION DÉPARTEMENTALE

Le nombre total de jardins recensés affiche une légère baisse passant de 1 089 en 2022 à **926 en 2023**.

C'est la ville de Nantes qui concentre le plus de comptages (104), suivi de Saint-Nazaire (40). Ainsi, 80 % des communes de Loire-Atlantique ont fait l'objet de comptages.

Distribution des jardins ayant participé au comptage 2023




## LES OISEAUX DÉNOMBRÉS




Les tendances des observations faites en 2023 sont sensiblement les mêmes que pour les années précédentes, avec en moyenne 25 oiseaux et 9 espèces par jardin.

La fréquence d'observation des oiseaux varie énormément selon les espèces. En effet, certains sont difficiles à voir du fait de leur taille ou de leur habitude. D'autres espèces se font rares car leur population est en baisse. C'est le cas pour le Merle noir dont la fréquence d'apparition, est passée de 78 % à 63 % entre 2012 et 2023. Au contraire, la fréquence d'apparition d'autres espèces est en hausse par exemple, le Moineau domestique passe ainsi de 62 % en 2021 à 72 % en 2023.

### ► Les 10 espèces les plus abondantes en 2023



### ► Les 10 espèces les plus fréquentes (%) en 2023



**21 502** oiseaux  
comptés au total

---

**25** oiseaux par jardin

**9** espèces par jardin



Respecter le protocole est indispensable pour le traitement et l'analyse des données reçues ! Pour cela, il s'agit de noter les oiseaux que l'on a identifiés, pendant 1h, l'un des deux jours proposés.

Si vous souhaitez transmettre vos données tout au long de l'année, vous pouvez utiliser la plateforme suivante : [www.faune-loire-atlantique.org](http://www.faune-loire-atlantique.org) !



La **taxonomie**, c'est faire un grand inventaire du vivant sous forme de catégories organisées et hiérarchisées afin de pouvoir « ranger » les individus dans l'une d'elles.

C'est aussi un moyen de décrire la biodiversité afin de mieux comprendre notre planète et donc de découvrir de nouvelles espèces jusqu'alors encore inconnues.

Afin de réaliser ce classement, les taxonomistes cherchent à connaître le lien de parenté entre les espèces. Pour ce faire, ils se basent sur la **morphologie** et **l'anatomie** de l'espèce, mais également sur **son ADN**. Découvrir ce lien permet de comprendre l'origine des espèces. C'est comme un travail de détective !


Chaque espèce porte un nom en latin composé du genre auquel elle appartient (ex : *Parus*) et de son épithète spécifique (ex : *major*). Ce dernier est choisi par le scientifique qui a décrit l'espèce en premier, il peut choisir celui qu'il veut !



Nom vernaculaire : Mésange charbonnière  
Nom scientifique : *Parus major*



Nom vernaculaire : Mésange à longue queue  
Nom scientifique : *Aegithalos caudatus*



Surprise, même avec un nom vernaculaire semblant indiquer un lien de parenté, les espèces peuvent appartenir à deux familles différentes ! C'est le cas de la Mésange charbonnière et la Mésange à longue queue ! Cette dernière appartient à la famille des Aegithalidae et non des Paridae.

## CONSEIL PRATIQUE : UN JARDIN ACCUEILLANT ET VIVANT

Pour accueillir les mésanges dans son jardin breton en hiver, quelques gestes simples peuvent faire toute la différence.

Premièrement, offrez-leur un abri. Vous pouvez installer des nichoirs spécialement conçus pour les mésanges (ouverture de 28 à 32 mm de diamètre), placés à une hauteur appropriée d'au moins 2 mètres du sol et orientés vers le sud-est pour les protéger des intempéries.

Ensuite, l'alimentation est importante. Les mésanges apprécient une variété de graines et de noix. Optez pour un mélange de graines de tournesol, de millet, de maïs concassé et de cacahuètes non salées. Les distributeurs

suspendus ou les mangeoires adaptées à leur taille sont parfaits. Veillez à garder vos mangeoires propres pour éviter la propagation de maladies.

Protégez-les aussi du froid en ajoutant des éléments naturels à votre jardin. Des buissons denses, des haies et des arbustes offrent des endroits où les mésanges peuvent se percher et se cacher du vent glacial. Une astuce simple consiste également à laisser des tas de feuilles ou de branches pour leur offrir des cachettes naturelles.

Enfin, évitez l'utilisation de pesticides ou de produits chimiques mortels à la faune et à la flore des jardins et à la vie en général.

## OISEAU 2023 : LA MÉSANGE CHARBONNIÈRE



La Mésange charbonnière est la mésange la plus grande de toutes celles rencontrées dans l'ouest de la France. C'est une espèce sédentaire qui s'adapte à de nombreux milieux grâce à sa grande plasticité écologique. Ainsi, on la retrouve toute l'année dans des milieux arborés, les forêts caducifoliées, mais également dans les parcs, les jardins en ville.

Cette espèce plutôt commune est souvent observée accompagnée par un ou plusieurs de ses congénères en période inter-nuptial, mais elle devient agressive et territoriale en période de reproduction. La mésange niche dans tous types de cavités. Elle se plaira aussi bien dans les cavités arboricoles que dans les nichoirs artificiels des jardins. Son régime alimentaire est diversifié. Elle peut être insectivore, en période de reproduction et présente un penchant plus prononcé pour les fruits et les graines le reste du temps. Comme la majorité des passereaux, on retrouve la Mésange charbonnière partout en France. Sa population n'est pas en déclin, elle a même tendance à augmenter au fil des années, notamment en Loire-Atlantique.



Distribution des jardins avec observation de Mésange charbonnière en janvier 2023

**MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION**

**Prochaine édition :  
27 et 28 janvier 2024**

Partenaires opérationnels de l'opération

